

# RATIMOR BRODI CEBO BLANDO

- RODENTICIDA



Almacenes de alimentos



Restaurantes



Plantas de procesos

## I. Descripción del Producto

**Ratimor** es un veneno para combatir ratas y ratones que se presenta en forma de cebo. El cebo viene listo para ser usado, este contiene ingredientes cuidadosamente seleccionados para atraer a los roedores. Se mantiene húmedo y palatable durante varios días.

Este producto es efectivo para controlar roedores en industrias alimentarias, agroindustrias, avícolas y salud pública, a la vez es inofensivo para el ser humano, por lo que se puede usar en el hogar.

Ratimor mata a las ratas por ingestión acumulativa y progresiva en un periodo de 2 a 3 días.

Este sirve para exterminar el ratón domestico (*Mus musculus*), la rata negra (*Rattus rattus*) y la rata parda (*Rattus norvegicus*).

## II. Presentación

<b>Presentación</b>	Envases de plástico HDPE y potes de plástico.
<b>Material</b>	- Baldes x 10 Kilos - Pote x 1K

## III. Composición

<b>Tipo de producto</b>	Raticida
<b>Formulación</b>	Cebo fresco (PASTA BAIT)
<b>Naturaleza química</b>	Cumarina
<b>Ingrediente Activo</b>	Brodifacoum

## IV. Propiedades Física/Química

<b>Estado físico</b>	Sólido
<b>Apariencia</b>	Cebo fresco
<b>Color</b>	azul
<b>Olor</b>	Olor característico

## V. Modo de uso

**RATIMOR BRODI CEBO BLANDO** para el Control de roedores en Salud Pública e Industrial. La especie atacada es la rata parda (*Rattus norvegicus*), rata negra (*Rattus rattus*) y el ratón doméstico (*Mus musculus/ domesticus*).

Es usado como rodenticida en y alrededor de establecimientos como: Hospitales, plantas de proceso, almacenes de alimentos, restaurantes, etc., para exterminar el ratón doméstico (*Mus musculus*), la rata negra (*Rattus rattus*) y la rata parda (*Rattus norvegicus*).

**DOSIFICACION Y APLICACION** Infestación de ratas: Establecer puntos de cebo de hasta 50g. En caso de infestaciones severas, ubicar los puntos de cebo espaciados en 10m. e ir reduciendo a 5m. Una vez ubicado el rodenticida no cambiar o modificar los puntos de cebo por varios días. Si no se ven signos de actividad de roedor cerca de los puntos de cebo por 7 a 10 días, entonces retirar el cebo a un área de mayor actividad.

Infestación de ratones: Establecer puntos de cebo de hasta 15g. de cebo rodenticida. En caso de infestaciones severas, ubicar los puntos de cebo espaciados en 5m. e ir reduciendo a 2m. Los ratones olisquean mucho y el mover los cebos cada 2 o 3 días ayudara al programa de manejo y control de roedores, cuando los puntos de cebo son inspeccionados y/o llenados.

Colocar los cebos rodenticidas donde haya signos de actividad, tales como excrementos frescos, cerca de madrigueras, rutas de paso y fuentes de comida. Usar tantos cebos como sea necesario.

### **DOSIFICACION PARA USO CON TRAMPA TIPO JAULA:**

Se recomienda usar de **1 a 2 sobres de RATIMOR BRODI CEBO BLANDO, por Jaula**. Las dosificaciones son referenciales, recomendamos consultar con nuestro especialista técnicos.

## VI. Manejo y Almacenamiento

<b>Precauciones</b>	No comer, beber y fumar
<b>Medidas específicas para manipulación segura</b>	El producto debe ser manipulado por personal capacitado.
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	Almacenar el producto en un lugar seco y aireado, en sus envases originales y con sus sellos inalterados.
<b>Embalaje recomendado</b>	Recomendado: envase primario: bolsas de polipropileno; envase secundario; estuches de cartulina y baldes de plásticos.

## VII. Medidas de primeros

<b>Inhalación</b>	No comer, beber y fumar
<b>Contacto con la piel</b>	Lavar con agua y jabón durante al menos 15 minutos. Quitar la ropa contaminada. Buscar atención médica.
<b>Contacto con los ojos</b>	Lavar con abundante agua templada durante 15 minutos, levantando los párpados de vez en cuando. Buscar atención médica.
<b>Ingestión</b>	No debe inducirse el vómito, debe practicarse lavado gástrico, solo bajo supervisión médica y con protección de la vía aérea en pacientes con compromiso de conciencia. Buscar atención médica.